

附件1					
42个云南省中药饮片炮制规范修订项目目录					
序号	品种	原标准号	修订项目	修订前	修订后
1	醋郁金	云YPBZ-0152-2008	修订炮制	取郁金饮片置容器内，加醋拌匀，吸尽，用文火炒至切面呈淡黄棕色至灰棕色，取出，干燥，筛去碎屑，即得。 每1000g郁金饮片，用醋100g及适量水。	取净郁金片置容器内，加醋拌匀，吸尽，用文火炒至切面呈淡黄棕色至灰棕色，取出，晾凉，筛去碎屑，即得。 每1000g净郁金片，用醋100g及适量水。
			增加薄层色谱鉴别	无	取本品粉末2g，加无水乙醇25ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取郁金对照药材2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》四部 通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（17:3）为展开剂，预饱和30分钟，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显

